

BROCHURE D'INFORMATION POUR LE PATIENT : OPERATION DE LA CATARACTE

Dr med. Lilly Khamsy

FMH Ophtalmologie



FMH Ophtalmochirurgie

Ancienne cheffe de clinique universitaire

Place des Foudres 1, 1950 Sion

Tel. 027 552 55 25

contact@cliniquebellevue.ch



La cataracte est une opacification du cristallin, la lentille qui est dans l'œil. Les rayons lumineux parviennent moins bien dans l'œil, sur la rétine, ce qui entraîne une vision trouble.

L'opération de la cataracte consiste à retirer le cristallin opacifié et à le remplacer par un cristallin artificiel transparent.

Le résultat de cette opération est excellent dans 95% des cas, mais comme toute intervention chirurgicale il y a des risques de complications, même si celles-ci sont rares.

Les complications majeures de l'opération de la cataracte sont rares. Les infections (1 cas sur 1000), saignements à l'intérieur de l'œil (1 cas sur 1000), décollements de la rétine (apparition brutale de flash lumineux, voile sombre immobile devant l'œil), déplacement de l'implant, opacification de la vitre de l'œil (cornée). Très rarement, cela peut entraîner une perte de vision dans l'œil opéré, voire la perte de l'œil. D'autres complications moins sévères tels qu'un hématome du blanc de l'œil, une chute partielle de la paupière supérieure, une plaie insuffisamment étanche, la perception de mouches volantes, une sensibilité à la lumière, une opacification capsulaire postérieure secondaire, une irritation de l'œil et l'augmentation de la pression de l'œil peuvent survenir. Une deuxième opération est parfois nécessaire.

Prix. L'opération de la cataracte est remboursée dans les prestations de base de la LAMal avec déduction de la franchise et de la participation aux frais (10% à charge du patient). Le choix de l'implant peut engendrer des frais supplémentaires à charge du patient.

La précision de la correction de la vision dépend des défauts réfractifs de l'œil avant l'opération. Les lunettes de lecture peuvent être nécessaires après l'opération. Il peut y avoir des imprécisions dans la réfraction obtenue après l'opération, qui peuvent être corrigées avec des lunettes.

A EFFECTUER AVANT L'OPÉRATION

- Lire cette brochure
- Remplir le formulaire d'anesthésie et le prendre à la Clinique à l'opération
- Pharmacie : retirez les **gouttes** sans tarder auprès de votre pharmacie

Prenez une douche et lavez vos cheveux la veille.

LE JOUR DE L'OPÉRATION



Ne vous maquillez pas, **ne mangez pas**, ne fumez pas, ne buvez pas d'alcool **6 heures avant l'opération**. Vous pouvez boire de l'eau, du café ou du thé sans lait jusqu'à 2 heures avant l'opération.

Prenez :

- votre carte d'assurance maladie
- vos médicaments habituels avec une gorgée d'eau
- si vous prenez de l'insuline, ne prenez qu'une demi-dose de votre insuline lente, et pas d'insuline rapide. Parlez-en avec votre médecin traitant.

A la Clinique, le personnel soignant mettra des gouttes dans votre œil pour dilater la pupille et endormir l'œil. Vous porterez une blouse de protection et une voie veineuse sera mise en place sur votre bras. En salle d'opération, vous serez allongé sur le dos, le pourtour de votre œil est nettoyé, un drap stérile couvre votre visage, vous entendrez mais ne verrez pas l'opération. Le Dr Khamsy regarde à travers un microscope et vous demandera de fixer la lumière du microscope. L'opération dure environ 20 minutes et est indolore. Vous aurez un pansement avec une **coque** sur l'œil opéré. **Prévoyez de rester à la Clinique environ 2h30.**

APRÈS L'OPÉRATION

Douleurs après l'opération

L'œil peut être rouge, vous pouvez ressentir une irritation, une sensation de brûlure et la vision peut être floue ce qui disparaît en principe quelques jours après l'opération. En cas de douleurs prenez contact avec Dr Khamsy.

Conduite automobile

Prévoyez d'être accompagné pour le retour après l'opération ainsi que pour les rendez-vous postopératoires. Nous demandons de ne pas conduire durant une semaine à partir de l'opération.

Travail

Vous pouvez retourner au travail 3 jours après l'opération. Si vous travaillez dans un environnement poussiéreux il vous faudra attendre 10 jours avant de reprendre vos activités. Un arrêt de travail sera remis à votre demande.

Vision, lunettes et soleil

La vision peut être trouble durant les premières semaines. L'œil met jusqu'à 8 semaines pour guérir complètement. Pour votre confort, vous pouvez porter des lunettes de soleil. Vos anciennes lunettes devront être changées 4 à 6 semaines après l'opération. Il faudra effectuer des examens annuels pour surveiller la santé oculaire.

Activités

Durant 7 jours après l'opération :

- **Evitez de toucher ou frotter l'œil opéré**, il faut le garder propre
- **Évitez l'eau et le savon dans l'œil opéré durant 2 semaines**, lavez le visage avec une lavette et les cheveux en inclinant la tête en arrière. Évitez la natation.
- **Evitez les efforts, ne portez pas des objets de plus de 20 kg**
- **Coque** : Le lendemain de l'opération, vous pourrez retirer la coque en plastique. Dormez avec la coque en plastique **pendant 1 semaine**, pour éviter de vous toucher ou frotter accidentellement l'œil durant la nuit.
- Pendant la journée, vous pouvez porter vos anciennes lunettes ou la coque si vous le souhaitez.
- Vous pouvez lire, marcher, regarder les écrans, vous raser la barbe.

Après 2 semaines vous pourrez :

- Maquiller les yeux, teindre les cheveux
- Pratiquer la course à pied

Après 1 mois vous pourrez :

- Pratiquer la natation
- Voyager à l'étranger

En cas d'urgence

Si vous présentez les symptômes suivants, appelez sans tarder :

Baisse inattendue/subite de la vue
Douleur croissante
L'apparition d'un voile noir dans le champ visuel

Cabinet ophtalmologique Dr Khamsy +41 27 5 525 525

Numéro privé Dr Khamsy +41 79 564 75 73 (même le soir ou le week-end)

Numéro urgences de Jules Gonin + 41 21 626 81 11

GOUTTES À METTRE DANS L'OEIL OPÉRÉ

AVANT l'opération



La veille de l'opération

Yellox collyre : 1 x le matin + 1 x le soir



Le jour de l'opération

Yellox collyre : 1 x le matin

APRÈS l'opération



Yellox collyre 2x/jour : 1x le matin + 1x le soir pendant 3 semaines, puis stop



Tobradex pommade (remis à la clinique après l'opération)
+ **coque pour dormir** : pendant **7 nuits**
après l'opération, appliquer 1cm dans l'œil,
puis avec le **Sparadrap transpore** fixer la
coque de protection sur l'œil opéré



Tobradex collyre (remis à la clinique après l'opération)
pendant 1 semaine **4x/jour** : matin – midi – après-midi – soir
pendant 1 semaine **3x/jour** : matin – midi – soir
pendant 1 semaine **2x/jour** : matin – soir
pendant 1 semaine **1x/jour** : matin
puis stop



Lacrycon collyre pour hydrater l'œil **4x/jour** ou plus si besoin

Attendre **5 minutes** entre l'application des différentes gouttes.

Veuillez continuer votre traitement habituel en plus de ce traitement.